

14147-61112-1- CE_Ismayati.docx *by*

Submission date: 29-Apr-2021 10:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 1573445863

File name: 14147-61112-1-CE_Ismayati.docx (313.54K)

Word count: 3510

Character count: 21513

**KARAKTERISTIK MOLEKULER KELELAWAR (*MICROCHIROPTERA*),
BERDASARKAN DNA MITOKONDRIA (GEN COI)
DI GUA SUKABUMI DAN SENTUL JAWA BARAT**

**MOLECULAR CHARACTERISTICS OF BATS (*MICROCHIROPTERA*) BASED ON
MITOCHONDRIAL DNA: COI IN THE CAVE SUKABUMI AND SENTUL**

17 Ismayati Afifah^{1*}, Dedy Duryadi Solihin^{1*}, Arzyana Sunkar²

¹ Program Studi Biosains Hewan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor

² Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor

*Corresponding author: dduryadi@yahoo.com

Abstrak

Cytochrome Oxidase I (COI) merupakan salah satu gen mitokondria untuk membantu konstruksi dari pohon filogeni yang dapat bertindak sebagai gen marker. Gen COI memiliki keakuratan dalam mengidentifikasi spesies dan umumnya digunakan sebagai "DNA Barcoding". Informasi mengenai karakteristik genetik berdasarkan DNA mitokondria pada kelelawar di Sukabumi dan Sentul belum banyak dilaporkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keragaman genetik kelelawar berdasarkan DNA mitokondria dengan penanda *Cytochrome Oxidase I* (COI) sebagai DNA barcoding. Isolasi DNA total dilakukan menggunakan Kit Dneasy® Blood and Tissue Kit cat no 69504 (50) berdasarkan prosedur *Spin-Column Protocol* dengan modifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gen COI telah berhasil mengidentifikasi karakteristik spesies. Dua haplotipe didapatkan dari masing-masing populasi. Berdasarkan barcode DNA menunjukkan populasi Sukabumi merupakan spesies *Chaerephon plicatus* dengan nilai identitas genetik sebesar 97,08%, sedangkan populasi Sentul menunjukkan perbedaan secara genetik dengan spesies *Hipposideros larvatus* dengan nilai identitas genetik sebesar 94,85%. Identifikasi secara genetik dengan menggunakan gen COI menunjukkan bahwa kelelawar yang berasal Sukabumi adalah spesies *Chaerephon plicatus* dengan jarak genetik sebesar 3,1%. Kelelawar yang berasal dari Sentul memiliki kedekatan dengan spesies *Hipposideros larvatus* namun memiliki jarak genetik sebesar 5,2%.

Kata kunci: COI; Gua; Identifikasi spesies; Kelelawar; Sentul; Sukabumi

Abstract

Cytochrome Oxidase I (COI) is one of the mitochondrial genes to help the construction of phylogeny trees that can act as marker genes. The COI gene has accuracy in identifying species and is commonly used as "DNA Barcoding". Information about genetic characteristics based on mitochondrial DNA in bats in Sukabumi and Sentul has not been widely reported. The purpose of this study was to determine the genetic diversity of bats based on Mitochondrial DNA with Cytochrome Oxidase I (COI) markers as DNA barcoding. Total DNA isolation was carried out using the Dneasy® Blood and Tissue Kit paint no. 69504 (50) based on the Spin-Column Protocol procedure with modifications. The results of this study indicate that the COI gene has successfully identified species characteristics. Two haplotypes were obtained from each population. Based on DNA barcodes, the population of Sukabumi is a species of *Chaerephon plicatus* with a genetic identity value of 97.08%, while the Sentul population shows genetic differences with the *Hipposideros larvatus* species with a genetic identity value of 94.85%. Genetic identification using the COI gene shows that the bats originating from Sukabumi is a species *Chaerephon plicatus* with a genetic distance of 3.1%. The bats originating from Sentul are closely related to the species *Hipposideros larvatus* but have a genetic distance of 5.2%.

Keywords: Bats; Cave; COI; Sentul; Species identification; Sukabumi

Formatted: Font: Italic

Formatted: Justified, Space After: 3 pt

Formatted: Line spacing: Multiple 1.15 ll

PENDAHULUAN

Kelelawar merupakan mamalia yang memiliki kemampuan terbang. Kelelawar ²klasifikasikan ke dalam ordo *Chiroptera*. Ordo tersebut dibagi menjadi dua subordo, yaitu *Megachiroptera* (pemakan buah-buahan) dan *Microchiroptera* (pemakan serangga) (Suyanto, 2001). Kelelawar berperan penting dalam proses ekologi, seperti membantu penyebaran benih, penyerbukan, dan penyeimbang populasi serangga (Aguirre, Lens, & Matthysen, 2003). Keberadaan kelelawar di dalam gua, dapat berperan sebagai kunci penyedia energi ekosistem (*key factor in cycle energy*) bagi organisme yang ada di dalam gua. Oleh sebab itu, apabila ekosistem gua tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, baik ekosistem yang ada di dalam gua maupun ekosistem yang ada di luar gua (Wijayanti, 2011).

Spesies kelelawar yang sama ditemukan dalam satu gua dapat disebabkan oleh beberapa faktor, beberapa faktor tersebut di antaranya ialah kondisi lingkungan yang sesuai, makanan yang masih tersedia, dan ketidakhadiran predator, sehingga masih banyak kelelawar yang hidup, dan bertahan di tempat tersebut. Kondisi iklim yang sesuai dengan kebutuhan kelelawar. Seckerdieck, Walther, dan Halle (2005) membuktikan bahwa kelelawar mempunyai *home instink* yang kuat, tempat tinggal yang dipilih kelelawar dipertahankan sampai beberapa generasi. Apabila tempat tinggal mendapat gangguan dan kelelawar tidak nyaman dan aman, tempat tinggal ini akan ditinggalkan (Willis & Brigham, 2004).

International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyatakan bahwa kawasan karst memegang peranan penting bagi kelangsungan biodiversitas di bumi. Hal ini karena kawasan karst memiliki keunikan biodiversitas, baik di permukaan (*eksokarst*) maupun di bawah permukaan (*endokarst*). Kelelawar adalah salah satu biodiversitas di *endokarst*. Di dunia terdapat 18 famili, 192 genus, dan lebih dari 977 spesies kelelawar (Nowak, 1999). Di Indonesia, terdapat 8 famili, di dalamnya terdapat 72 spesies anggota subordo *Megachiroptera* dan 133 spesies anggota subordo *Microchiroptera* yang sebagian besar hidup di gua. Namun, seluruh biodiversitas termasuk kelelawar khususnya anggota subordo *Microchiroptera* yang memiliki peranan penting secara ekologi dan bagi masyarakat di kawasan karst mengalami ancaman kepunahan massal.

Genetika molekuler dibutuhkan terkait dengan ketepatan mengidentifikasi spesies dan mendukung hasil identifikasi berdasarkan sifat morfologi. Identifikasi suatu organisme mulai spesies hingga subspecies secara akurat terhadap berbagai spesies yang sulit dibedakan secara morfologi dapat menggunakan *DNA barcoding* (Hebert, Ratnasingham, & De Waard, 2003). Gen *Cytochrome Oxidase 1* (COI) merupakan salah satu kelompok gen yang dapat dijadikan sebagai marka molekuler untuk menentukan spesies pada DNA mitokondria (Solihin, 1994).

Gua di kawasan Sukabumi dan Sentul Jawa Barat merupakan tempat tinggal bagi komunitas kelelawar. Gua di kawasan ini dijadikan sebagai objek wisata, sehingga dikhawatirkan populasi kelelawar di dalamnya maupun ekosistem gua itu sendiri akan mengalami gangguan. Ekosistem terutama dalam kaitannya dengan ekosistem luar gua, maka dibutuhkan pola pengelolaan gua yang tepat. Pola pengelolaan gua yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan informasi yang luas mengenai ekosistem gua serta segala sesuatu yang menyangkut berlangsungnya proses ekologi yang terkait.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keragaman genetik kelelawar berdasarkan DNA mitokondria dengan penanda COI sebagai *DNA barcoding*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keragaman kelelawar dan memberikan informasi tentang identitas molekuler kelelawar melalui pendekatan genetik berdasarkan penanda gen COI.

MATERIAL DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada April 2018. Lokasi pengambilan sampel di gua wilayah Sukabumi (Gua Lalay Palabuhan Ratu) dan Sentul (Gua Agung Garunggang). Analisis molekuler sampel kelelawar dilakukan di Laboratorium Biologi Konservasi Hewan, Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi (PPSHB) Institut Pertanian Bogor.

Identifikasi keelawar diawali dengan penangkapan keelawar dengan menggunakan jaring kabut (*mistnet*). Jaring kabut yang dipakai untuk menangkap keelawar adalah jaring yang memiliki *mesh* (lebar mata jaring) 30–37 mm dengan ketebalan benang jaring 80 Denier (1 Denier= masa 90 m benang nilon skala gram). Penangkapan keelawar juga dapat menggunakan *handnet*, terutama untuk keelawar yang berukuran besar. Keelawar yang diidentifikasi ialah keelawar yang sudah dewasa dan utuh tubuhnya (Suyanto, 2001).

Isolasi DNA Total

DNA diekstraksi dari darah keelawar. Isolasi DNA total dilakukan menggunakan Kit *Dneasy® Blood and Tissue Kit* cat no 69504 (50) berdasarkan prosedur *Spin-Column* protocol (Qiagen, 2003). Darah dimasukkan ke dalam *tube* sebanyak 40 μ L, ditambahkan larutan ATL sebanyak 200 μ L, ditambahkan *Proteinase-K* sebanyak 25 μ L, diinkubasi pada suhu 56 °C selama 1 jam, ditambahkan larutan AL sebanyak 200 μ L, dihomogenkan secara manual menggunakan tangan, diinkubasi pada suhu 56 °C selama 10 menit, ditambahkan EtOH sebanyak 200 μ L, simpan di dalam *freezer* selama 1 jam, dihomogenkan kembali secara manual menggunakan tangan. Sampel dipindahkan ke dalam *spin column*, dihomogenkan menggunakan sentrifus dengan kecepatan 8.000 rpm selama 1 menit, ditambahkan larutan AW 1 sebanyak 500 μ L, dihomogenkan menggunakan sentrifus dengan kecepatan disentrifugasi 8.000 rpm selama 1 menit, ditambahkan larutan AW 2 sebanyak 500 μ L, dihomogenkan menggunakan sentrifus dengan kecepatan disentrifugasi 13.000 rpm selama 1 menit, cairan dibuang, kemudian dihomogenkan kembali menggunakan sentrifus dengan kecepatan disentrifugasi kembali 13.000 rpm selama 1 menit, ditambahkan larutan AE sebanyak 100 μ L dan diamkan selama 15 menit. Sebanyak 2–3 μ L larutan ini digunakan sebagai *template* campuran *Polymerase Chain Reaction* (PCR).

Ampifikasi Gen Amplifikasi Gen COI DNA Mitokondria dan Sekuensing Produk PCR

Proses replikasi DNA melalui PCR dengan menggunakan bahan kit *14 R* dan dNTP. Volume komposisi bahan-bahan PCR sebanyak 25 μ L yang terdiri atas ddH₂O; 8,8 μ L. *5x Buffer* Q5; 4,0 μ L, *5x Enhancer* Q5; 5,0 μ L, dNTP; 1,0 μ L, primer *forward* Mc_COI_GH_F (5'-GGC GCT TGA GCA GGC ATA GT-3') dan primer *reverse* Mc_COI_GH_R (5'-GGG ATG CCC GAA GAA TCA GA-3'); 1,0 μ L. DNA total; 3,0 μ L dan Taq DNA *polymerase*; 0,2 μ L. dilakukan dengan menggunakan mesin PCR. Kondisi PCR meliputi tahapan pre-denaturasi 94 °C selama 1 menit, denaturasi 94 °C selama 45 detik, *annealling* 56,6 °C selama 45 detik, elongasi 72 °C selama 1 menit sebanyak 35 siklus; *post PCR*: ekstensi 72 °C selama 5 menit.

Sekuensing produk PCR dikerjakan di Laboratorium *First Base, Selangor, Malaysia*. Sampel sekuensing dikirim melalui Laboratorium *Genetica Science*, dan dikerjakan di Laboratorium *First Base, Selangor, Malaysia*.

Analisis Data

Data hasil sekuensing baik *forward* maupun *reverse* disejajarkan (*alignment*) menggunakan *software Molecular Evolutionary Genetics Analysis* (MEGA) versi 7,0 (Kumar, Stecher, & Tamura, 2016). Hasil gabungan penjabaran kemudian dikoreksi dengan primer *forward* maupun primer *reverse*. Sekuen utuh hasil koreksi tersebut disejajarkan kembali antar individu dalam lokasi gua yang sama dan antar lokasi gua yang berbeda. Verifikasi hasil sekuen untuk mengetahui identitas jenis masing-masing individu berasal dari gua yang sama maupun berbeda dilakukan dengan sekuen standar dari *GenBank* melalui program *Basic Local Alignment Search Tool-nucleotide* (BLASTn) di situs *National Center for Biotechnology Information* (NCBI). Rekonstruksi pohon filogenetik menggunakan metode *Neighbor-joining* dengan Bootstrap 1.000x (Kumar et al., 2016).

HASIL

Ekstraksi DNA dan Amplifikasi Gen COI Mitokondria.

Formatted: Font: Italic


Hasil ekstraksi DNA total, dari 11 sampel Sukabumi dan 12 sampel Sentul setelah dilakukan elektroforesis menunjukkan pita jelas dan terang (Gambar 1). Kemudian untuk mengetahui konsentrasi dari DNA dilakukan uji Nanodrop. Hasil uji Nanodrop menunjukkan konsentrasi DNA cukup baik, setelah dilakukan uji Nanodrop DNA tersebut kemudian dijadikan cetakan DNA untuk mengamplifikasi gen COI dengan menggunakan teknik PCR.



Gambar 1. Hasil pita elektroforesis DNA sampel

Amplifikasi dan Visualisasi DNA

Terdapat 23 sampel individu dari masing-masing lokasi, 11 individu berasal dari Gua Lalay Sukabumi dan 12 individu berasal dari Gua Agung Garunggang Sentul. Amplifikasi gen COI menggunakan primer spesifik dengan panjang sekuen 650 bp. Hasil ekstraksi DNA total, setelah dilakukan elektroforesis menunjukkan pita jelas dan terang. Hal ini karena konsentrasi DNA yang cukup tinggi (Gambar 2).



Gambar 2. Visualisasi pita DNA gen COI Sukabumi (1), Sentul (2), dan Marker 1 kb (M)

Karakteristik Gen COI

Analisis molekuler berhasil dilakukan terhadap 23 sampel terdiri atas 11 individu berasal dari Sukabumi dan 12 individu berasal dari Sentul. Amplifikasi gen COI dengan menggunakan primer spesifik menunjukkan panjang sekuen gen COI (650 bp) sesuai target (Gambar 2).

Hasil penajajaran berganda (*multiple alignment*) dari interpopulasi Sukabumi dan Sentul beserta *outgroup* *Rhinolophus macrotis* dan *Rhinolophus luctus* dari *GenBank* menunjukkan bahwa gen COI menghasilkan situs konservatif sebesar 467 bp (71,08%), situs variabel 190 bp (28,91%), situs parsimoni 139 bp (21,15%), dan *singleton* 51 bp (7,7%). Komposisi basa nukleotida gen COI interspesies menunjukkan bahwa rata-rata tertinggi adalah Timin (29,2%), dan Sitosin (27,7%), diikuti Adenin (26,0%), dan paling rendah adalah Guanin (17,0%).

Identifikasi Berdasarkan Sekuen Parsial Gen COI

Berdasarkan hasil identifikasi genetik dari masing-masing lokasi terdapat spesies *Chaerephon plicatus* (Sukabumi) dan *Hipposideros larvatus* (Sentul). Identifikasi spesies kelelawar dilakukan dengan melihat tingkat kemiripan (%) sekuen gen COI antara spesies jenis yang didapat dan jenis spesies kelelawar yang tersedia di *GenBank*. Sampel yang berasal dari Sukabumi merupakan spesies

Chaerephon plicatus dengan nilai *Query-cover* sebesar 98% dan nilai *identity* 97,08%. Sampel yang berasal dari Sentul berdasarkan hasil BLASTn lebih dekat dengan *Hipposideros larvatus* dengan nilai *Query-cover* sebesar 97% dan nilai *identity* 94,85% (Tabel 1).


Tabel 1. Hasil BLASTn gen COI

Lokasi	Kode sampel	Spesies	Alignment BLAST-n gen COI				Deskripsi
			<i>Query-cover</i>	<i>Ident (%)</i>	Kode akses		
Gua Lalay Sukabumi	SKB Sp 1	<i>Chaerephon plicatus</i>	98%	97,08%	KY581660.1		<i>Chaerephon plicatus</i> voucher ROM MAM 118373 mitochondrion, partial genome
	SKB Sp 2						
	SKB Sp 3						
	SKB Sp 4						
	SKB Sp 5						
	SKB Sp 6						
	SKB Sp 7						
	SKB Sp 8						
	SKB Sp 9						
	SKB Sp 10						
	SKB Sp 11						
Gua Agung Garungga ng Sentul	STL Sp 1	<i>Hipposideros larvatus</i>	97%	94,85%	HM540393.1		<i>Hipposideros cf. larvatus</i> CMF-2010 voucher THK41323 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitochondrial
	STL Sp 2						
	STL Sp 3						
	STL Sp 4						
	STL Sp 5						
	STL Sp 6						
	STL Sp 7						
	STL Sp 8						
	STL Sp 9						
	STL Sp 10						
	STL Sp 11						
	STL Sp12						

Hubungan Kekerabatan dan Keragaman Haplotipe Intraspecies

Rekonstruksi pohon filogenetik pada sampel kelelawar asal Sukabumi dan Sentul dilakukan berdasarkan model kimura 2-parameter dan metode Neighbor-Joining (NJ) dengan nilai Bootstrap 1.000 kali pengulangan. Hasil rekonstruksi pohon filogenetik pada sampel Sukabumi, Sentul dan outgroup menunjukkan dua klaster. Klaster (I) terdiri atas populasi Sukabumi (1a) dan spesies *Chaerephon plicatus* (KY581660.1) (1b), klaster (II) terdiri atas populasi Sentul (2a) dan spesies *Hipposideros larvatus* (HM540393.1) (2b), sedangkan Outgroup terdiri atas *Rhinolophus macrotis* dan *Rhinolophus luctus* (Gambar 3).

Hasil analisis haplotipe intraspecies pada populasi Sukabumi dan Sentul menunjukkan masing-masing dua haplotipe berbeda. Klaster (I) berdasarkan 6n COI menunjukkan bahwa terdapat subklaster dari populasi Sukabumi (1a) yang terdiri atas dua haplotipe: haplotipe satu terdiri atas individu 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 10. Haplotipe dua terdiri atas individu 4, 6, 8, dan 11. Klaster (II) terdapat subklaster dari populasi Sentul (2a) yang terdiri atas dua haplotipe: haplotipe satu terdiri atas individu 1, 2, 3, 4, 5, dan 8 serta haplotipe dua terdiri atas individu 6, 7, 9, 10, 11, dan 12. (Tabel 2).



Gambar 3. Hubungan kekerabatan kelelawar asal Sukabumi dan Sentul berdasarkan *bootstrap neighbor-joining* (NJ) dengan 1.000 kali pengulangan dengan model evolusi kimura 2-parameter berdasarkan gen COI

Tabel 2. Posisi basa nukleotida yang polimorfik berdasarkan lokasi Sukabumi dan Sentul

Populasi (Sukabumi)	Situs nukleotida ke-	Populasi (Sentul)	Situs nukleotida ke-
	267		471
<i>Chaerephon plicatus</i> (KY581660)	A	<i>Hipposideros larvatus</i> (HM 540393.1)	C
SKB Sp 1	G	STL Sp 1	C
SKB Sp 2	G	STL Sp 2	C
SKB Sp 3	G	STL Sp 3	C
SKB Sp 4	A	STL Sp 4	C
SKB Sp 5	G	STL Sp 5	C
SKB Sp 6	A	STL Sp 6	T
SKB Sp 7	G	STL Sp 7	T
SKB Sp 8	A	STL Sp 8	C
SKB Sp 9	G	STL Sp 9	T
SKB Sp 10	G	STL Sp 10	T
SKB Sp 11	A	STL Sp 11	T
		STL Sp 12	T

Jarak Genetik Intra dan Inter Spesies

Berdasarkan perbedaan rata-rata jarak genetik gen COI dengan model *kimura 2-parameter* menghasilkan intra individu populasi Sukabumi sebesar 0,001 atau 0,1% dan populasi Sentul sebesar 0,001 atau 0,1%. Rata-rata jarak genetik antar populasi Sukabumi dan Sentul sebesar 0,192 atau 19,2%. Perbedaan rata-rata jarak genetik populasi Sukabumi dan spesies *Chaerephon plicatus*

(KY581660.1) sebesar 0,031 atau 3,1% dan populasi Sentul dengan spesies *Hipposideros larvatus* (HM540393.1) sebesar 0,052 atau 5,2% (Tabel 3).

Tabel 3. Jarak genetik intra dan inter populasi kelelawar asal Sukabumi dan Sentul berdasarkan gen COI

No.	Lokasi	Jarak genetik
1	Sukabumi	0,001 (0,1%)
2	Sentul	0,001 (0,1%)
3	Sukabumi vs Sentul	0,192 (19,2%)
4	Sukabumi vs <i>Chaerephon plicatus</i> (KY581660)	0,031 (3,1%)
5	Sentul vs <i>Hipposideros larvatus</i> (HM 540393.1)	0,052 (5,2%)

PEMBAHASAN

Amplifikasi gen COI menggunakan primer spesifik dengan panjang sekuen 650 bp. Hasil ekstraksi DNA total, setelah dilakukan elektroforesis menunjukkan pita jelas dan terang. Hal ini karena konsentrasi DNA yang cukup tinggi. Faktor yang memengaruhi keberhasilan amplifikasi gen COI adalah kemurnian DNA hasil purifikasi (Sentausa, 2003). Komposisi bahan pereaksi, serta kondisi PCR yang tepat, terutama pada proses penempelan primer pada tahap *annealing*. Tahap *annealing* memungkinkan primer *forward* dan *reverse* akan menempel secara spesifik pada kedua ujung DNA cetakan sehingga dibutuhkan optimasi suhu pada tahap ini. Suhu optimum penempelan primer pada saat amplifikasi sampel yaitu 59 °C. Jika suhu penempelan primer terlalu tinggi dari suhu optimum, menyebabkan primer tidak menempel pada DNA cetakan. Jika suhu penempelan primer terlalu rendah dari suhu penempelan optimum menyebabkan *mispriming*, yaitu penempelan primer pada tempat yang salah pada DNA cetakan sehingga dihasilkan produk non spesifik. Oleh karena itu, dilakukan optimasi terhadap suhu penempelan primer (Newton & Graham, 1997).

Penyejajaran 23 sampel sekuen DNA menunjukkan bahwa terdapat situs variabel sebesar 28,91%, dan situs konservasi sebesar 71,08% berdasarkan gen COI parsial. Berdasarkan posisi basa nukleotida yang polimorfik dari lokasi Sukabumi hanya terdapat satu situs basa nukleotida yang berbeda yaitu pada situs 267 dan lokasi Sentul hanya terdapat satu situs basa nukleotida yang berbeda, yaitu pada situs 471. Gen COI biasanya digunakan sebagai “DNA Barcode” karena memiliki komposisi nukleotida yang sedikit variasi, sehingga gen ini hanya digunakan untuk identifikasi spesies pada berbagai taksa (Solihin, 1994; Hebert et al., 2003).

Identifikasi spesies kelelawar dilakukan dengan melihat tingkat kemiripan (%). Sekuen gen COI antara jenis yang didapat dan jenis kelelawar yang tersedia di *GenBank*. Sampel yang berasal dari Sukabumi merupakan spesies *Chaerephon plicatus* dengan nilai *Query-cover* sebesar 98% dan nilai *identity* 97,08%. Sampel yang berasal dari Sentul berdasarkan hasil BLASTn lebih dekat dengan *Hipposideros larvatus* dengan nilai *Query-cover* sebesar 97% dan nilai *identity* 94,85% (Tabel 1). Berdasarkan nilai *identity* gen COI diketahui bahwa sampel dari Sentul memiliki nilai perbedaan sebesar >3%. Menurut Hebert et al. (2003) jika identitas genetik spesies tersebut memiliki perbedaan sebesar >3% maka spesies tersebut adalah spesies yang berbeda. Peneliti lain, yaitu Tobe, Kitchener, dan Linacre (2010) memberikan kisaran yang lebih rendah lagi yaitu antara 0,015–0,025 terutama untuk spesies mamalia. Oleh karena itu spesies kelelawar yang ditemukan di Sentul ada kemungkinan merupakan “spesies berbeda”. Namun demikian ketidaktersediaan data di *GenBank* belum dapat ditentukan jenis spesiesnya baru dapat di tentukan kedekatannya. Apabila sudah dapat ditentukan spesiesnya secara definitif maka akan dicatatkan di *GenBank* dengan kode akses tertentu dan dapat dijadikan standar spesies yang ada di Indonesia.

Hasil analisis haplotipe ins. 5 spesies pada populasi Sukabumi dan Sentul menunjukkan masing-masing dua haplotipe berbeda. Variasi yang terjadi pada basa nukleotida disebabkan oleh adanya mutasi. Mutasi menjadi penyebab utama perbedaan variasi basa nukleotida pada gen COI. Variasi yang kecil dapat memengaruhi keidentikan suatu spesies dan bahkan dapat memengaruhi susunan asam amino yang mengkodekan protein (Cracraft & Helm-Bychowski, 1991).

Hasil-jarak genetik populasi *sentul-Sentul* dengan ha⁶ BLASTn *menunjukkan*-diduga spesies *Hipposideros larvatus* memiliki perbedaan secara genetik. Menurut Hebert et al. (2003) jika identitas genetik spesies tersebut menunjukkan perbedaan di atas 3% maka spesies tersebut adalah spesies yang berbeda. Kelompok populasi *tersebut* masih berasal dari ori⁵ spesies yang sama. Gen-gen yang berasal dari nenek moyang (*ancestors*) masih tetap diturunkan. Semakin besar nilai jarak genetik (*p-distance*) di antara suatu populasi atau individu, semakin terisolasi antara satu dengan lainnya. Jarak genetik menunjukkan kemungkinan adanya pe⁵aruh isolasi geografis terhadap suatu populasi (Ingman, Kaessmann, Pääbo, & Gyllensten, 2000). Kisaran nilai jarak genetik untuk membedakan intrspesies pada mamalia menurut Tobe et al. (2010) yaitu antara 0,015–0,025.

SIMPULAN

Identifikasi secara *genetik* dengan menggunakan gen COI menunjukkan bahwa kelelawar yang berasal dari Gua Lalay Sukabumi adalah spesies *Chaerephon plicatus* dengan jarak genetik sebesar 3,1%. Kelelawar yang berasal dari Gua Agung Garunggang memiliki kedekatan dengan spesies *Hipposideros larvatus* namun memiliki jarak genetik sebesar 5,2%~~-%~~.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi dan BKPH Bogor KPH Bogor RPH Babakan Madang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat yang telah memberikan perizinan penelitian dan pengambilan sampel di Gua Lalay Palabuhan Ratu Sukabumi dan Gua Agung Garunggang Sentul.

15 REFERENSI

- Aguirre, L., Lens, L., & Matthysen, E. (2003). Pattern of roost use by bats in a neotropical savanna: Implications for conservation. *Biological Conservation*, 11(3), 435-443. doi: 10.1016/S0006-3207(02)00313-0.
- 11 Hebert, P. D. N., *Ratnasingham, Ratnasingham, S., & De Waard, J. R.* (2003). Barcoding animal life: Cytochrome c oxidase subunit I divergences among closely related species. *Proceedings of The Royal Society B: Biological Sciences*, 270, 96-99. doi: 10.1098/rsbl.2003.0025.
- Cracraft, J., & Helm-Bychowski, K. (1991). *Parsimony and phylogenetic inference using DNA sequences: Some methodological strategies in phylogenetic analysis of DNA sequences*. New York: Oxford University Press.
- Ingman, M., Kaessmann, H., Pääbo, S., & Gyllensten, U. (2000). Mitochondrial genome variation and the origin of modern humans. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 408(6813), 708-713. doi: 10.1038/35047064.
- 18 Kumar, S., Stecher, G., & Tamura, K. (2016). MEGA7: Molecular evolutionary genetics analysis version 7. *2* or bigger datasets. *Molecular Biology and Evolution*, 33(7), 1870-1874.
- Newton, C. R., & Graham, A. (1997). *PCR introduction to biotechnology second edition*. Oxford (GB): Bios Scientific Publisher Ltd.
- Nowak, R. M. (1999). *Walker's mammals of the world, vol. I*. Baltimore and London: John Hopkins University Press.
- 13 gen. (2003). *QIAamp DNA mini kit and DNA blood mini kit handbook*. Germany: Qiagen pr.
- Seckerdieck, A., Walther, B., & Halle, S. (2005). Alternative use of two different roost types by a maternity colony of the lesser horseshoe bat (*Rhinolophus hipposideros*). *Mammalian Biology-Zeitschrift für Säugetierkunde*, 70(4), 201-209. doi: 10.1016/j.mambio.2004.10.002.
- 2 Sentausa, E. (2003). Studi DNA *3*asejarah dari tulang manusia Situs Arkeologi Ta¹lako, Sulawesi Tengah (Skripsi sarjana). Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.
- Solihin, D. D. (1994). Peran DNA mitokondria (mtDNA) dalam studi keragaman genetik dan biologi populasi pada hewan. *Hayati*, 1(1), 1-4.

Suyanto, A. (2001). *Kelelawar di Indonesia seri panduan lapangan*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi-LIPI.

16 Tobe, S. S., Kitchener, A. C., & Linacre, A. M. T. (2010). Reconstruction mammalian phylogenies: A detailed comparison of the *cytochrome b* and *cytochrome oxidase subunit i* mitochondrial genes. *PLOS One*, 5(11), e14156.

Wijayanti, F. (2011). Ekologi, relung pakan, dan strategi adaptasi kelelawar penghuni gua di Karst Gombong Kebumen Jawa Tengah (Disertasi doctoral). Program Studi Mayor Biosains Hewan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.

12 Willis, C. K. R., & Brigham, M. (2004). Roost switching, roost sharing and social cohesion: Forest-dwelling big brown bats, *Eptesicus fuscus*, conform to the fission-fusion model. *Animal Behaviour*, 68, 495-505. doi: 10.1016/j.anbehav.2004.12.002.

ORIGINALITY REPORT

36%

SIMILARITY INDEX

36%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[repository.ipb.ac.id:8080](https://repository.ipb.ac.id/8080)

Internet Source

7%

2

docobook.com

Internet Source

5%

3

jurnal.fkip.uns.ac.id

Internet Source

3%

4

www.neliti.com

Internet Source

2%

5

Era Monalisa, Feky Recky Mantiri, Hanry Jefri Lengkong. "Kajian Variasi Sekuens Interspecies dan Filogeni Kelelawar Pteropus sp. Menggunakan Gen COI", Jurnal MIPA, 2019

Publication

2%

6

journal.ipb.ac.id

Internet Source

2%

7

es.scribd.com

Internet Source

2%

8

media.neliti.com

Internet Source

2%

9	idoc.pub Internet Source	2%
10	id.123dok.com Internet Source	1%
11	www.biorxiv.org Internet Source	1%
12	www.plan-actions-chiropteres.fr Internet Source	1%
13	mafiadoc.com Internet Source	1%
14	Jarulis Jarulis, Dedy Duryadi Solihin, Ani Mardiasuti, Lilik Budi Prasetyo. "VARIASI INTERSPESIFIK JULANG (AVES: BUCEROTIDAE) INDONESIA BERDASARKAN GEN CYTOCHROME-B DNA MITOKONDRIA", BERITA BIOLOGI, 2019 Publication	1%
15	www.ufrrj.br Internet Source	1%
16	eprints.utm.my Internet Source	1%
17	lppm.ipb.ac.id Internet Source	1%
18	peerj.com Internet Source	1%

19

Eni Kusrini, Alimuddin Alimuddin, Mohammad Zairin, Dinar Tri Sulistyowati. "IDENTIFIKASI IKAN CUPANG (Betta imbelis) TRANSGENIK FOUNDER MEMBAWA GEN PENYANDI HORMON PERTUMBUHAN; Identification of Transgenic Founder Betta Fish (Betta imbelis) Carry Growth Hormone Gene.", Jurnal Riset Akuakultur, 2017

Publication

1 %

20

dropdoc.ru
Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%